

DE FLAMINGO IN GRONINGEN

Jouke Prop

Na de oeielaar nu een voorpublicatie van de Avifauna Groningen over de flamingo, een vogel die in kleine aantallen voorkomt. De latijnse namen zijn *Phoenicopterus ruber* Linnaeus, *Phoenicopterus chilensis* Molina

Flamingo's worden voornamelijk in de Lauwersmeer waargenomen en incidenteel elders langs de kust. Ze komen voor in ondiepe slenken met vrij slikkige bodem, zowel in zoet- als in zoutwatergebieden. Vooral in de Lauwersmeer zijn grote oppervlakten slenkgebied voor deze vogel aantrekkelijk.

De flamingo kan het hele jaar worden

aangetroffen. Bij aanhoudende vorst vertrekken de vogels, mogelijk naar gebieden met langere tijd niet bevroren water zoals de Zeeuwse Delta. Tweemaal zijn dode flamingo's in de Lauwersmeer gevonden tijdens vorstperiodes: op 14 december 1977 en 11 december 1978. Er is ook een waarneming van een naar het zuiden overtrekkend exemplaar bij het Leekstermeer op 14 december 1975. Sinds de afsluiting van de Lauwerszee



... Ju.

zijn de aantallen toegenomen. De jaarmaxima in de Lauwersmeer zijn als volgt:

1970- 1	1975-13	1979- 8
1971- 4	1976-15	1980- 4
1972- 6	1977-16	1981- 4
1973- 7	1978-19	

Behalve in de Lauwersmeer is de flamingo waargenomen in de Dollard, op het wad vóór Emmapolder en de Linthorst-Homanpolder en op het Eemshaventerrein. Waarnemingen hebben meestal betrekking op de soort *Phoenicopterus chilensis* uit Zuid-Amerika, dus waarschijnlijk op ont-

snapte vogels. Tweemaal is de in Zuid-Europa voorkomende soort *P. ruber roreus* beschreven: begin november 1940 en 3 november 1975. Ook deze vogels kunnen uit gevangenschap zijn ontsnapt.

